MERCK

Gebruiksaanwijzing Pergoveris® voorgevulde pen

- 300 I.E. + 150 I.E. / 0,48 ml
- 450 I.E. + 225 I.E. / 0,72 ml
- 900 I.E. + 450 I.E. / 1,44 ml



Pergoveris®
(Follitropine alfa / Lutropine alfa)

inhoud

- 01 -
Belangrijke informatie over de Pergoveris® voorgevulde pen

- 02 -
Voordat u uw Pergoveris® voorgevulde pen gaat gebruiken

- 03 -
Uw Pergoveris® voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

- 04 -
De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

- 05 -
De dosis injecteren

- 06 -
Na de injectie

- 07 -
De Pergoveris® voorgevulde pen bewaren

Belangrijke informatie over de Pergoveris® voorgevulde pen

- De Pergoveris® voorgevulde pen is uitsluitend bedoeld voor subcutane injectie.
- Gebruik de Pergoveris® voorgevulde pen alleen zoals uw medische zorgverlener u heeft geleerd hoe u de pen correct moet gebruiken.
- De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster geven het aantal Internationale Eenheden, of I.E.'s, en de dosis follitropine alfa weer. Uw arts zal u vertellen hoeveel I.E.'s follitropine alfa u elke dag moet injecteren.
- De getallen die in het dosisterugkoppelingsvenster worden weergegeven, helpen u om:
  a. de aan u voorgeschreven dosis te kiezen.
  b. te controleren of u een volledige injectie heeft gegeven.
  c. de resterende dosis af te lezen die met een tweede pen moet worden geïnjecteerd.
- Geef uzelf de injectie elke dag op hetzelfde tijdstip.
- Uw arts/apotheker zal u vertellen hoeveel Pergoveris®-pennen u nodig heeft om uw behandeling te voltooien.

LET OP: *Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over het aanbevolen doseringsschema en houd u altijd aan de door uw arts aanbevolen dosering.*

LET OP: *Gebruik naalden niet opnieuw. Verwijder de naald onmiddellijk na elke injectie. Deel de pen en/of naalden niet met anderen, anders kan dit een infectie veroorzaken.*

LET OP: *Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u uw Pergoveris® voorgevulde pen gebruikt. Volg de instructies zorgvuldig op, want die kunnen verschillen van wat u gewend bent.*

Inhoud

voordat u uw Pergoveris® voorgevulde pen gaat gebruiken

- Was uw handen met water en zeep.
- Maak in een goed verlichte ruimte een schone plaats en een vlak oppervlak, zoals een tafel of keukenblad, klaar.
- Selecteer uw Pergoveris® voorgevulde pen. Controleer of u de voorgeschreven pen heeft geselecteerd.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de pen.
- U heeft ook het volgende nodig: naalden *(meegeleverd in de verpakking)* / alcoholdoekjes *(niet meegeleverd in de verpakking)* / een container voor scherp afval *(niet meegeleverd in de verpakking).*



1 dop van de pen	6 dosisinstellingsknop
2 naaldaansluiting met schroefdraad	7 buitendop naald
3 reservoirhouder	8 binnenbescherming naald
4 plunjerzuiger	9 verwijderbare naald
5 dosisterug-koppelingsvenster	10 verzegeling

Inhoud

U w Pergoveris® voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

1 Verwijder de dop van de pen

2 Controleer of het dosisterug-koppelingsvenster op "0" staat



3 Maak uw naald klaar voor injectie

- Neem een nieuwe naald – gebruik uitsluitend de meegeleverde naalden 'voor eenmalig gebruik'.
- Houd de buitendop van de naald stevig vast.
- Controleer of de lostrekbare verzegeling op de buitendop van de naald niet beschadigd is of los zit.
- Verwijder de lostrekbare verzegeling.

LET OP:
Als de lostrekbare verzegeling beschadigd is of los zit, mag u de naald niet gebruiken. Gooi de naald weg in een container voor scherp afval. Neem een nieuwe naald.

4 Bevestig de naald

- Schroef de tip met schroefdraad van de Pergoveris® voorgevulde pen in de buitendop van de naald totdat u een lichte weerstand voelt.
- Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig aan te trekken.
- Bewaar deze om later opnieuw te gebruiken. NIET weggooien.
- Houd de Pergoveris® voorgevulde pen vast met de naald omhoog gericht.
- Verwijder de groene binnenbescherming voorzichtig en gooi deze weg.



LET OP: *Bevestig de naald niet te strak, daardoor kan de naald na de injectie moeilijk te verwijderen zijn.*

Plaats de groene binnenbescherming niet opnieuw op de naald. Daardoor kunt u zich aan de naald prikken.

5 Controleer de punt van de naald op een druppeltje vloeistof

- Kijk goed naar de punt van de naald of daar een of meerdere kleine druppeltjes vloeistof te zien zijn.

INDIEN	DAN
U een nieuwe pen gebruikt	Controleert u of er aan de punt van de naald een druppeltje vloeistof te zien is. • Als u een druppeltje ziet, ga dan naar hoofdstuk: "*De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven*". • Als er geen druppeltje te zien is, *volg dan de instructies op de pagina hieronder*.
U een pen opnieuw gebruikt	U hoeft NIET te controleren of er een druppeltje vloeistof te zien is. Ga meteen naar hoofdstuk: *"De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven".*

Als u de eerste keer dat u een nieuwe pen gebruikt geen kleine druppeltjes vloeistof op of vlak bij de punt ziet, gaat u als volgt te werk:

1. Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom totdat u “25” in het dosisterugkoppelingsvenster ziet staan. U kunt de dosisinstellingsknop terugdraaien als u deze voorbij “25” heeft gedraaid.



2. Houd de pen vast met de naald omhoog gericht.

3. Tik zacht tegen de reservoirhouder.

4. Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk in. Er verschijnt een druppeltje vloeistof aan de punt van de naald.



5. Controleer of het dosisterug-koppelingsvenster “0” weergeeft.

6. Ga verder bij hoofdstuk *“De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven”*.

Inhoud

De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven

6 Draai de dosisinstellingsknop totdat uw benodigde dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven

Draai de dosisinstellingsknop verder om een hogere dosis te kiezen



Draai de dosisinstellingsknop terug om de dosis te corrigeren



LET OP: *Controleer of uw volledige voorgeschreven dosis in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven voordat u verder gaat met de volgende stap.*

Inhoud

De dosis injecteren

1. Kies een injectieplaats in het gebied dat uw arts of verpleegkundige heeft aangewezen als gebied om de injectie in toe te dienen. Kies elke dag een andere injectieplaats, om irritatie van de huid tot een minimum te beperken.

2. Veeg de huid schoon met een alcoholdoekje.



3. Controleer nogmaals of de juiste dosis wordt weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster.

4. Injecteer de dosis zoals u heeft geleerd van uw arts of verpleegkundige.

- Duw de naald langzaam volledig in de huid.
- Duw de dosisinstellingsknop langzaam zo ver mogelijk in en houd deze vast om de volledige injectie te voltooien.
- Houd de dosisinstellingsknop ten minste 5 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis injecteert.
- Het dosisgetal dat in het dosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven, springt terug op "0".
- Trek na ten minste 5 seconden de naald uit de huid terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt.
- Wanneer de naald uit de huid is teruggetrokken, laat u de dosisinstellingsknop los.

LET OP: *Laat de dosisinstellingsknop niet los voordat u de naald uit de huid heeft verwijderd.*

Zorg er altijd voor dat u voor elke injectie een nieuwe naald gebruikt.

Inhoud

Na de injectie

Controleer of u een volledige injectie heeft gegeven

- Controleer of het dosisterug-koppelingsvenster “0” weergeeft.

LET OP: *Als het dosisterugkoppelings-venster een getal hoger dan “0” weergeeft, is de Pergoveris® voorgevulde pen leeg en heeft u niet uw volledige voorgeschreven dosis gekregen.*

Voer een gedeeltelijke injectie uit
(alleen indien nodig)

- Het dosisterugkoppelingsvenster geeft de ontbrekende hoeveelheid aan die u moet injecteren met een nieuwe pen.
- Herhaal hoofdstuk *“Voordat u uw Pergoveris® voorgevulde pen gaat gebruiken”* tot en met hoofstuk *“Uw Pergoveris® voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie”* met een tweede pen.

Verwijder de naald na elke injectie

- Plaats de buitendop van de naald op een vlak oppervlak.
- Houd de Pergoveris® voorgevulde pen met één hand stevig vast en schuif de naald in de buitendop van de naald.

- Duw de naald met de dop erop vervolgens tegen een stevig oppervlak totdat u een klik (“klik”) hoort.

- Pak de buitendop van de naald vast en schroef de naald los door deze linksom te draaien. Gooi de gebruikte naald op een veilige manier weg.
- Doe de dop opnieuw op de pen.

LET OP: *Gebruik naalden die al gebruikt zijn nooit opnieuw. Deel naalden nooit met iemand anders.*

de Pergoveris® voorgevulde pen bewaren

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.
- Na opening kan de voorgevulde pen gedurende maximaal 28 dagen buiten de koelkast (bij 25°C) worden bewaard.
- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
- Gebruik Pergoveris® niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.
- Gooi de naald na de injectie op een veilige manier weg.
- Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

De inhoud van deze gehele brochure is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing 10/2021 en de patiëntenbijsluiter 10/2021 van Pergoveris®

LET OP: *Bewaar de pen nooit met de naald er nog op bevestigd. Verwijder de naald altijd van de Pergoveris® voorgevulde pen voordat u de dop opnieuw op de pen doet.*

Inhoud

NL-PER-00002 V2 - APPROVAL DATE 04/2022

Merck B.V.
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk
Tel: +31 (0)20 658 28 00
www.merckfertiliteit.nl